

Lichenum cacuminum Tatraënsium I.

Auctore: Dr. Ö. Szatala (Budapest).

(Eingegangen am 20. XI. 1929.)

A Magas Tatra lichenológiai kutatása 1918 óta úgyszólván teljesen a cseh és lengyel botanikusok kezébe került. Nagy hálával tartozunk tehát **Dr. Györffy István** szegedi egyetemi ny. r. tanár úrnak, aki bryológiai tanulmányai mellett időt szakított magának a tatrai zuzmók gyűjtésére is. Az alább felsorolt zuzmókat **Györffy** professzor úr főleg a Magas-Tatra csúcsain gyűjtötte.

Crocynia membranacea (**Dicks.**) **A. Zahlbr.**
Supra caespites *Hedwigiae* in „Tscheckengrund”, alt. ca 960 m.

Solorina crocea (**L.**) **Ach.**

Supra terram in cacumine „Zöldtavi csúcs” = Grünersee Spitze, alt ca 2529 m.

S. spongiosa (**Sm.**) **Anzi.**

Supra terram ad viam in silvis inter Villa Lerch et Sarpanyec, ad pedem montis Tatra alt, ca 780 m.

Peltigera rufescens (**Weis**) **Humb.**

Supra terram in valle Trümmertal: östl. Eiser-nes Tor-Sattel, alt. ca 2240 m.

Bélaer Kalkalpen unter dem Drechslerhäuschen „Schusterknöpfchen”, supra terram.

Lecidea armeniaca fo. nigrita **Schaer.**

Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt ca 2556 m.

L. obscurissima **Nyl.**

Bélaer Kalkalpen: Supra saxa quarcitica in monte „Thörichter Gern” = Glupy Vrch, alt. ca. 1960 m.

L. decipiens fo. dealbata (**Mass.**) **Jatta.**

Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, supra terram.

L. testacea (**Hoffm.**) **Ach.**

Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, alt. ca. 1440 m, supra saxa calcarea.

Thalloedaema candidum (**Web.**) **Mass.**

Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte „Thörichter Gern”, alt. ca 1980 m.

Rhizocarpon geographicum fo. atrovirens (**L.**) **Mass.**

Tscheckengrund” circa „Demeter szikla” alt. ca 920 m, supra saxa granitica.

R. geographicum fo. contiguum (**Schaer.**) **Mass.**

Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki csúcs” = „Kesmarker Spitze”, alt. ca 2556 m.

Cladonia coccifera var. stemmatina **Ach.**

Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra terram.

Cl. subsquamosa fo. luxurians **Nyl.**

Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra caespites

Orthotrichi.

Cl. gracilis v. chordalis (**Flk.**) **Schaer.**

Inter muscos in valle „Menguszfalvi völgy” = Mengsdorfertal, supra lac. Froschseen, alt. ca 1980 m.

Cl. gracilis var. chordalis fo. amaura **Flk.**

Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra terram.

Cl. elongata fo. exoncera (**Ach.**) **And.**

Supra terram in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt. ca 2556 m.

Gyrophora cylindrica fo. denudata (**Turn.**)

Mudd.

Bélaer Kalkalpen: supra saxa quarcitica in monte „Thörichter Gern”, alt. ca 1980 m.

G. cylindrica var. Delisei (**Nyl.**) **Sydow.**

Supra saxa granitica in cacumine „Zöldtavi csúcs” = Grünersee Spitze, alt. ca 2529 m.

G. depressa (**Ach.**) **Schaer.**

Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt. ca 2530 m.

Biatorella coracina (**Smrft.**) **Lyng.**

Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt. ca 2556 m.

Pertusaria lactea (**L.**) **Arn.**

Tscheckengrund circa „Demeter szikla”, alt. ca 920 m, supra saxa granitica.

Placodium Lamarckii (**DC.**) **Müll. Arg.**

Bélaer Kalkalpen: supra saxa calcarea in monte „Greiner”, alt. ca 2100 m.

Pl. fragile (**Scop.**) **Szat.**

Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte „Glupy Vrch”, alt. ca 1980 m.

Haematomma ventosum (**L.**) **Mass.**

Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt. ca 2556 m.

Parmelia pubescens (**L.**) **Wain.**

Supra saxa granitica in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt. ca 2536 m.

P. saxatilis fo. panniformis **Schaer.**

Tscheckengrund, alt. ca 980 m, supra muscos.

Cetraria nivalis (**L.**) **Ach.**

Supra terram in cacumine „Késmárki csúcs” = Kesmarker Spitze, alt. ca 2546 m.

C. cucullata (**Bell.**) **Ach.**

Supra terram in cacumine „Weber-Spitze”,
alt. ca 2524 m.

C. islandica (L.) Ach.

Supra terram in cacumine „Kesmarker Spitze”,
alt. ca 2556 m, et „Grünersee Spitze”, alt. ca
2536 m.

C. stuppea Fw.

Supra saxa granitica in cacumine „Kesmarker
Spitze”, alt. ca 2536 m.

Dufourea madreporiformis (Wulf.) Ach.

Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte
„Thöricht Gern”, alt. ca 1990 m.

Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl.

Supra terram in cacumine „Weissensee Spitze”,
alt. ca 2150 m, et „Weber-Spitze”, alt. ca 2524 m.

A. nigricans Ach.

Supra saxa granitica in cacumine „Zöldtavi
csúcs” = Grünersee Spitze, alt. ca 2536 m.

Ramalina carpathica Kbr.

Bélaer Kalkalpen: supra saxa quarcitica in

monte „Glupy Vrch” = Thöricht Gern, alt. ca
1980 m.

Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach.

Supra terram in cacumine „Kesmarker Spitze”,
alt. ca 2530 m, et „Grünersee Spitze”, alt. ca
2529 m.

Caloplaca ferruginea fo. *bryacea* (Vain.) Szat.

nov. comb. — *Lecanora ferruginea* fo. *bryacea* Vain.
Adjum. I. 1881. p. 144.

Bélaer Kalkalpen: Supra caespites *Grimmiae*
in monte „Glupy Vrch”, alt. ca 1980 m.

Gasparinia bracteatum (Hoffm.)

Bélaer Kalkalpen: supra terram in monte
„Thöricht Gern” = Glupy Vrch, alt. ca 1980 m.

G. elegans (Link.) Th. Fr.

Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, alt. ca
1420 m.

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Kbr.

Bélaer Kalkalpen: Drechslerhäuschen, alt. ca
1420 m, supra saxa calcarea.

